

## 蓝胸秧鸡亚种新纪录

### A NEW RECORD OF SUBSPECIES BLUE-BREASTED IN CHINA

#### 蓝胸秧鸡 *Rallus striatus albiventer* (Swainson)

*Rallus albiventer* Swainson, 1838, Animals in Menageries, 337 (印度)。Ail, S., and S. D. Ripley 1980 Handbook of the birds of India and Pakistan. Vol. 2, P. 153—154.; Deignan, H. G. 1945 The birds of northern Thailand. P. 103—104.; Smythies, B. E. 1935 The birds of Burma. P. 453—454. and P. 669.

1♂ 云南勐腊Ⅷ. 28.; 体重213, 全长270, 翅长127, 喙峰38.5, 跗蹠41.5, 尾长47.5。

本亚种与采自新平(3♂♂, 1♀Ⅹ. 7—9.), 文山(1♂, Ⅷ. 14.), 佛冲(1♀, Ⅶ. 13.), 丽江(1♀, Ⅹ8.)等地的*gularis*亚种的标本相比较, 背部和两胁多黑褐色, 而少橄榄褐色; 黑褐色带斑较宽疏, 头侧、颈侧及胸部的灰蓝色也较浓著; 上背及腰羽多呈白色横纹而少点斑。

该亚种在国外分布丁缅甸、泰国、印度和尼泊尔等地区。

杨岚 潘汝亮 王淑珍

(中国科学院昆明动物研究所)

注: 长度以毫米; 重量以克为单位。

本文1984年3月14日收到。